

Farmacia Pedro del Río Pérez
 C/ Mayor, Nº 3
 Quintana de Rueda
 24930 León
 Telf.: 987 337 151
pedrodelrio@uninet.edu
www.farmaciapedrodelrio.eu

FÓRMULAS MAGISTRALES DE USO HABITUAL

<p>Acné</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Crema-gel de Ácido Retinoico, 0'075% + Sulfacetamida·Na, 10% + Aloe vera, 10%, csp. 100 gramos • Crema-Gel de Ácido Retinoico, 0'1% + Aloe vera, 10% + Niacinamida, 4% + Zinc acetato, 1'2%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Ácido Retinoico (Tretinoína) 0'025-0'15% + Eritromicina 2-3%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Peróxido de Benzoílo 510%, csp. 100 gramos • Gel tópico (neutro) de Ácido Retinoico (Tretinoína), 0'025-015%, csp. 100 g • Gel tópico de Ácido Retinoico (Tretinoína) 0'025% + Clindamicina·HCl 1%, csp. 100 gramos • Gel tópico de Peróxido de Benzoílo 5-10%, csp. 100 gramos • Gel tópico de Benzoílo peróxido 5-10% + Eritromicina 2-4%, csp. 100 gramos • Gel tópico de Benzoílo peróxido 5-10% + Clindamicina·HCl 1%, csp. 100 gramos • Gel tópico de Benzoílo peróxido 5% + Clindamicina·HCl 1% + Clotrimazol 1% + Indometazina 2%, csp. 100 gramos • Gel tópico de Niacinamida 4%, csp. 100 gramos • Loción O/W de Acido Retinoico 0'05-0'15% + Nicotinamida 4% + Zinc acetato 1'2%, csp. 100 gramos • Loción O/W de Peróxido de Benzoílo 510%, csp. 100 gramos • Solución tópica de Eritromicina al 2 %, csp. 100 mL • Solución tópica de Ácido Salicílico 1-2% + Eritromicina 2 %, csp. 100 mL 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-2 aplicaciones/día. Se debe usar un protector solar de factor alto mientras dure el tratamiento (en las FM con Tretinoína)
-------------	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> Solución tópica de Eritromicina base 2-4% + Zinc acetato 1'2-2%, csp. 100 mL Cápsulas de Zinc gluconato 200 mg – Para una cápsula N° 100 	<ul style="list-style-type: none"> 200 mg/12 h/6 meses
Acné (mascarilla)	Mascarilla de Acido Retinoico 0'007% + Clindamicina·HCl 4% + Exto. Seco Manzanilla 0'50%, csp. 100 gramos	
Acrodermatitis enteropática	<ul style="list-style-type: none"> Solución oral de Zinc acetato 5 mg/mL, csp. 150 mL Cápsulas de Zinc acetato, 50 mg – Para una cápsula N° 100 	
Aftas bucales (colutorio)	<ul style="list-style-type: none"> Colutorio de Fluocinolona acetónido 0'4%, csp. 100 mL Colutorio de Hidrocortisona base 1%+ Sucralfato 5% + Tetraciclina·HCl 2%, csp. 100 mL Colutorio de Ácido Salicílico 0'5% + Triamcinolona acetónido 0'05-0'1%, csp. 100 mL Colutorio de Triamcinolona acetónido 0'05-0'1%, csp. 100 mL Colutorio de Benzocaína 0'5-1'5%+ Tintura de Mira 25% + Tintura de Ratania 25% + Agua purificada, csp. 100 mL Gel acuoso de Lidocaína·HCl 1-2%, csp. 100 gramos 	Enjuagar la boca con 10 mL al menos 5-10 minutos antes de las comidas. Procurar no ingerir el líquido. 1-4 aplic./día
Aftas bucales (pasta oral)	<ul style="list-style-type: none"> Pasta tópica oral de Exto. Equinácea 10% + Exto. Hipérico 10%, csp. 30 gramos Pasta tópica oral de Lidocaína·HCl 2% + Triamcinolona acetónido 0'1%, csp. 30 gramos Pasta tópica oral de Triamcinolona acetónido 0'1%, csp. 30 gramos Pasta tópica oral de Fluocinolona acetónido 0'1%, csp. 30 gramos 	Aplicar en capa fina sobre las lesiones después de comidas
Aftas orales sobreinfectadas por hongos	<ul style="list-style-type: none"> Pasta tópica oral de Clotrimazol 1% + Triamcinolona acetónido 0'1%, csp. 30 gramos Pasta tópica oral de Lidocaína·HCl 2% + Nistatina 100.000 UI/g + Triamcinolona acetónido 0'2%, csp. 30 gramos Pasta tópica oral de Nistatina 100.000-200.000 UI/g, csp. 30 gramos 	Aplicar en capa fina sobre las lesiones después de comidas
Aftas bucales, estomatitis aftosa recurrente	Colutorio de Tetraciclina·HCl 2'5-5%, csp. 100 mL	1-3 gargarismos/día
AINE (en pediatría)	Suspensión oral de Indometacina, 2 mg/mL, csp. 100 mL	
Alcalinizante urinario para patologías renales	Cápsulas de Sodio Bicarbonato 1 g – Para una cápsula N° 100	Según alcalinidad del paciente

Alopecia	<ul style="list-style-type: none"> • Champú de Acido Salicílico 2% + Minoxidilo, 2%, csp. 250 mL • Solución tópica de Difenciprona 0'001-2%, csp. 50 mL 	<ul style="list-style-type: none"> • 3-5 lavados/semana •
Alopecia androgénica	<ul style="list-style-type: none"> • Solución tópica de Dexametasona 2% + Estradiol (17α) 0'025%, csp. 100 mL • Solución tópica de Estradiol (17α) 0'025% + Minoxidilo 2-5%, csp. 100 mL 	1 aplicación/12 horas
Alopecia aretata	<ul style="list-style-type: none"> • Cápsulas de Zinc gluconato 200 mg – Para una cápsula N° 100 • Gel tópico de Ácido Retinoico (Tretinoína) 0'025-0'5% + Clobetasol propionato 0'05% + Minoxidilo 4-5%, csp. 100 gramos • Solución tópica de Acido Retinoico 0'010-0'025% + Clobetasol propionato 0'05% + Minoxidilo 5%, csp. 100 mL • Solución tópica de Diclorisona-21-acetato 0'1% + Minoxidilo 5%, csp. 100 mL • Solución tópica de Minoxidilo al 2-5%, csp. 100 mL • Solución tópica de Ácido Retinoico 0'01-0'025% + Clobetasol propionato 0'05% + Minoxidilo 5%, csp. 100 mL • Solución tópica de Ácido Retinoico 0'01-0'025% + Minoxidilo 5%, csp. 100 mL 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 cp/día • 1 aplicación/12 horas
Alopecia masculina	Cápsulas de Finasterida 1 mg – Para una cápsula N° 100	1 cp/día
Amebiasis (en pediatría)	Suspensión oral de Metronidazol, 10 mg/mL, csp. 100 mL	
Anemia	Solución oral de Vitamina B ₁₂ 1 mg/5 mL, csp. 100 mL	5 mL (1 mg)/24 horas
Angina de pecho (en pediatría)	<ul style="list-style-type: none"> • Jarabe de Propranolol 1 mg/mL, csp. 100 mL • Solución oral de Propranolol, 1 mg/mL, csp. 100 mL • Solución oral de Nifedipino 100 mg, csp. 100 mL 	
Ansiolítico (en pediatría)	Suspensión oral de Nitrazepam 0'1%, csp. 100 mL	
Antiarrítmico (en pediatría)	<ul style="list-style-type: none"> • Jarabe de Propranolol 1 mg/mL, csp. 100 mL • Solución oral de Propranolol, 1 mg/mL, csp. 100 mL • Suspensión oral de Amiodarona, 5 mg/mL, csp. 100 mL 	
Antiséptico, desinfectante.	Alcohol de 70°, csp. 100 mL	
Antiséptico bucal con úlceras dolorosas	Colutorio de Clorhexidina digluconato 0'2% + Lidocaína·HCl 2%, csp. 100 mL	2-4 enjuagues/día/después de comidas

Antiséptico bucal	Colutorio de Bórax 3% + Miel rosada 20% + Potasio clorato 2% + Cocimiento de llantén, csp. 100 mL	1-4 aplicaciones/día
Antiulceroso (Anti-H ₂ en pediatría)	Jarabe de Ranitidina·HCl 15 mg/mL, csp. 30 mL	
Antiulceroso (IBP en pediatría)	Suspensión oral de Omeprazol 2 mg/mL, csp. 100 mL	1 mg/Kg/día en 1 ó 2 tomas
Apnea (em pediatría)	Solución oral de Cafeína anhidra 500 mg, csp. 100 mL	
Atopia corporal	Crema O/W de Ácido Fusídico 2% + Tacrólimus 0'1%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Bulimia	Jarabe de Amitriptilina·HCl, 25 mg/mL, csp. 50 mL	
Calambres (en pacientes con patología hepática)	Cápsulas de Zinc sulfato, 220 mg – Para una cápsula N° 100	1 cp/12 horas
Candidiasis	Pomada de Nistatina 100.000 UI/g, csp. 100 gramos	2-4 aplicaciones/día
Candidiasis del pañal	<ul style="list-style-type: none"> • Pasta tópica de Ketoconazol (al agua) 2%, csp. 100 gramos • Pasta tópica de Nistatina (al agua) 150.000 UI/g, csp. 100 gramos 	1 aplicación en cada cambio de pañal
Candidiasis oral	<ul style="list-style-type: none"> • Pasta tópica oral de Clobetasol propionato 0'05% + Clotrimazol 1% + Lidocaina·HCl 2%, csp. 30 gramos • Pasta tópica oral de Clobetasol propionato 0'05% + Nistatina 100.000 UI/g + Lidocaina·HCl 2%, csp. 30 gramos 	3-4 aplicaciones/día
Caspa acompañada de seborrea. Psoriasis del cuero cabelludo.	Champú de Ácido Salicílico 4% + Coaltar 5% + Magnesio Piritiona 1'5%, csp. 250 mL	2-3 lavados/semana
Cerumen (eliminación del tapón de de los oídos)	Gotas óticas de Sodio Bicarbonato al 10%, csp. 50 mL	3-5 gotas/6-8 horas
Cicatrizante	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Aceite de Caléndula 10% + Exto. C. asiatica 10%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Aceite de Caléndula 10% + Ácido Tánico 5% + Exto. C. asiatica 10%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Aceite de Caléndula 5% + Exto. C. asiatica 5% + Exto. Hipérico 5%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Aceite de Rosa Mosqueta 10-20%, csp. 100 gramos 	1-3 aplicaciones/día
Cierre prematuro del ductus arterio-venoso	Suspensión oral de Indometacina, 2 mg/mL, csp. 100 mL	
Condiloma	Solución tópica de Podofilum peltatum resina al 25%, csp. 20 gramos	1 aplicación sobre la zona afectada. Dejar durante 4-6 horas y después lavar con agua y jabón. Aplicar 2 veces/semana (máx. 4 semanas)

Cortaduras tras el afeitado.	Aluminio·SO ₄ 89% + Aluminio Potasio·SO ₄ 11%	
Corticosteroide (en pediatría)	<ul style="list-style-type: none"> Jarabe de Dexametasona 1 mg/mL, csp. 100 mL Jarabe de Prednisona, 5 mg/mL, csp. 100 mL Suspensión oral de Dexametasona 1 mg/mL, csp. 50 mL Suspensión oral de Hidrocortisona, 1 mg/mL, csp. 100 mL Suspensión oral de Prednisona, 5 mg/mL, csp. 100 mL 	
Costra láctea del lactante	Solución tópica de Ácido Salicílico 2-4%, csp. 100 mL	Impregnar un algodón con la solución oleosa y aplicarlo sobre el cuero cabelludo una vez al día 5 minutos antes del baño
Costras y escoriaciones nasales	Pomada anhidra nasal de Mentol 0'5%, csp. 20 gramos	2-3 aplicaciones/día
Criptorquidia	Gel tópico genital de Testosterona propionato 2%, csp. 100 gramos	
Depresión	Jarabe de Amitriptilina·HCl, 25 mg/mL, csp. 50 mL	
Dermatitis seborreica del cuero cabelludo. Micosis del cuero cabelludo.	<ul style="list-style-type: none"> Champú de Ácido Salicílico, 2% + Bioazufre, 2'5% + Mentol 0'5%, csp. 250 mL Champú de Ácido Salicílico 2% + Coaltar 5% + Hidrocortisona 1% + Ketoconazol 2% + Piritiona Olamina 2%, csp. 250 mL Champú de Bioazufre 2'5% + Mentol 0'5%, csp. 250 mL Champú de Bioazufre 3% + Tioxolona 0'5%, csp. 250 mL Champú de Coaltar 10% + Ketoconazol 2%, csp. 250 mL Champú de Ketoconazol 2% + Tioxolona 0'5%, csp. 250 mL Champú de Ketoconazol 2% + Zinc Piritiona 2%, csp. 250 mL Champú de Ketoconazol al 2%, csp. 250 mL Crema O/W de Litio succinato 5 gramos, csp. 45 gramos Suspensión tópica de Fluocinolona acetónido 0'1% + Zinc piritiona 1%, csp. 100 mL Solución tópica de Ketoconazol 2% + Triamcinolona acetónido 0'05% + Urea 5%, csp. 100 mL Suspensión tópica oleosa de Aceite de Cade 25% + Aceite de Ricino 25% + Ácido Salicílico 25% + Aceite de Oliva 160 gramos Crema W/S de Litio succinato 	<ul style="list-style-type: none"> 2-4 veces/semana los champús 1 aplicación/12 horas 1 aplicación/12 horas 1 aplicación/12 horas 1 aplicación al acostarse y lavar con agua al día siguiente/5 días Se

	8% + Zinc sulfato 0'05%, csp. 100 gramos	aplica por la noche y se retira a la mañana siguiente con champú • 1 aplicación/12 horas
Dermatitis seborreica asociada a dermatomicosis	Pasta tópica de Ketoconazol 2% + Tardoak (Lassar) 1%, csp. 100 gramos	1 aplicación/12 horas
Dermatitis atópica, de contacto, alérgica	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Ácido Salicílico 2% + Hidrocortisona 2-5%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Cafeína anhidra 20% + Hidrocortisona 2-5%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Triamcinolona acetónido 0'1% + Urea 10% + Lanolina 6%, csp. 100 g • Crema O/W de Triamcinolona 0'1% + Urea 10%, csp. 100 g 	1-3 aplicaciones/día
Dermatitis con hiperqueratosis	Crema O/W de Ácido Salicílico 2-5% + Triamcinolona acetónido 0'1% + Urea 10%, csp. 100 gramos	
Dermatosis que cursen con mucha sequedad de piel	<ul style="list-style-type: none"> • Crema-Gel de Amonio Lactato 12% + Clobetasol propionato 0'05%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Amonio Lactato 12% + Clobetasol propionato 0'05%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Halcinónida 0'2% + Urea 10-15%, csp. 100 gramos 	1-2 aplicaciones/día
Dermatosis e inflamaciones. Picaduras de insectos	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Aceite de Caléndula 5%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Aceite de Caléndula 5% + Alantoína 0'5% + Clobetasol propionato, 0'05%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Aceite de Caléndula 15 + Exto. Hipérico 5% + Hidrocortisona 1%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Hidrocortisona base 12%, csp. 100 gramos • Crema W/O de Triamcinolona acetónido 0'1% + Urea 10-15%, csp. 100 gramos • Pomada anhidra de Aceite de Caléndula 5%, csp. 100 gramos • Crema W/O de Triamcinolona acetónido al 0'1%, csp. 100 gramos • Loción O/W de Triamcinolona acetónido 0'1% + Lanolina 6% + Urea 10%, csp. 100 gramos • Pomada anhidra de Hidrocortisona base 2%, csp. 100 gramos • Pomada de Acido Salicílico 1% + Alantoína 0'5% + Ictiol 1%, csp. 100 gramos 	1-3 aplicaciones/día
Desodorante y antitranspirante para pies	Solución tópica de Ácido Salicílico 2-5% + Formol 10-30%, csp. 500 mL	

Despigmentante cutáneo	<ul style="list-style-type: none"> • Crema-gel de Ácido Kójico, 2% + Ácido Retinoico, 0'025% + Extrapón Aloe vera, 10%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Ácido Azelaico 20% + Ácido Retinoico 0'025% + Clindamicina·HCl 1% + Hidroquinona 3% + Aloe vera 3%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Ácido Kojico 3% + Hidroquinona 3%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Hidroquinona 5% + Triamcinolona acetónido 0'1%, csp. 100 gramos 	1-2 aplicaciones/día
Diurético (en pediatría)	<ul style="list-style-type: none"> • Jarabe de Azetazolamida, 25 mg/mL, csp. 100 mL • Jarabe de Furosemida 2 mg/mL, csp. 100 mL • Solución oral de Furosemida 2 mg/mL, csp. 100 mL • Suspensión oral de Acetazolamida 20 mg/mL, csp. 50 mL • Suspensión oral de Hidroclorotiazida 2 mg/mL, csp. 100 mL 	<ul style="list-style-type: none"> • Dosis según peso y edad • Niños > 6 meses: 2 mg/kg/día, dividido cada 12 horas
Dolor asociado a artritis reumatoide	Crema O/W de Capsaicina al 0'025 - 0'2%, csp. 100 gramos	4-6 aplicaciones/día
Dolor severo	Solución oral de Morfina·HCl 1 mg/mL, csp. 100 mL	
Edema (en pediatría)	Suspensión oral de Espironolactona 10 mg/mL, csp. 100 mL	
Enfermedad de Wilson	<ul style="list-style-type: none"> • Solución oral de Zinc acetato 5 mg/mL, csp. 150 mL • Cápsulas de Zinc acetato, 50 mg – Para una cápsula N° 100 	
Enuresis nocturna	Jarabe de Amitriptilina·HCl, 25 mg/mL, csp. 50 mL	
Epilepsia (en pediatría)	Jarabe de Azetazolamida, 25 mg/mL, 100 mL	
Ezemas	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Aceite de Caléndula 10% + Ácido Salicílico 0'5-1% + Alantoína 0'5% + Hidrocortisona 2% + Urea 10%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Hidrocortisona base 12%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Zinc óxido 5-10%, csp. 100 gramos • Pomada anhidra de Brea de Hulla (Coaltar) 5-10% + Zinc óxido 10-30%, csp. 100 gramos 	1-2 aplicaciones/día
Ezemas con hiperqueratosis	Crema O/W de Ácido Salicílico 2-5% + Triamcinolona acetónido 0'1% + Urea 10%, csp. 100 gramos	
Estomatitis aftosa	Colutorio de Tetraciclina·HCl, 2-5% + Triamcinolona acetónido, 0'1 % +	4-5 aplicaciones/día

	Glicerina, csp. 50 g	
Estomatitis, faringitis, halitosis, aftas bucales	Colutorio de Bórax 1% + Esencia Salvia 0'05% + Esencia Tomillo 0'05% + Mentol 0'5%, csp. 100 mL	5-10 mL/50-250 mL de agua y hacer gárgaras
Fisura anal	<ul style="list-style-type: none"> • Gel tópico (neuro) de Nitroglicerina 0'2%, csp. 100 gramos • Pomada de Nitroglicerina 0'2%, csp. 100 gramos • Gel tópico de Diltiazem-HCl 2%, csp. 100 gramos • Gel tópico de Nifedipino al 0'2%, csp. 100 gramos 	1-4 aplicaciones/día
Foliculitis de zonas pilosas	<ul style="list-style-type: none"> • Gel tópico de Sodio Fusidato al 2-4%, csp. 100 gramos • Solución tópica de Gentamicina-SO₄ 0'1% + Sodio Fusidato 2-4%, csp. 100 mL 	2-3 aplicaciones/día
Glaucoma (en pediatría)	<ul style="list-style-type: none"> • Jarabe de Azetazolamida, 25 mg/mL, csp. 100 mL • Suspensión oral de Acetazolamida 20 mg/mL, csp. 50 mL 	
Grietas del pezón en madres lactantes (tratamiento y prevención)	Solución tópica de Ácido Tánico al 5%, csp. 100 gramos	Aplicar en el pezón después de la tetada y lavar con agua antes de la siguiente
Gota	Suspensión oral de Alopurinol, 20 mg/mL, csp. 100 mL	
Helmintiasis	Jarabe al 50% de Mebendazol al 3%, csp. 100 mL	100 mg (3'3 mL)/12 horas/3 días
Hemorroides	Solución oral de Castaño de Indias 20 g + Hamamelis 20 g, csp. 100 mL	5 mL (1 g)/8 horas después de comidas. No sobrepasar 5 g/día (aproximadamente 25 mL/día)
Hepatopatías (cirrosis, hepatitis crónica,...)	Solución oral de Fitomenadiona (Vitamina K1) al 1%, csp. 100 mL	
Heridas sobreinfectadas por gérmenes sensibles	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Aceite de Caléndula 10% + Cloranfenicol 1% + Ext. C. asiática 10% + Metronidazol 1%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Ext. C. asiática 1-10% + Neomicina-SO₄ 0'35%, csp. 100 gramos • Gel tópico de Fenitoína 1% + Lidocaína base 2% + Metronidazol 2% + Misoprostol 0'024%, csp. 100 gramos • Solución tópica de Gentamicina-SO₄ 0'3% + Aceite de Rosa Mosqueta, csp. 100 mL 	1-3 aplicaciones/día
Herpes labial, zoster	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Ext. Equinácea 10% + Ext. Hipérico 10%, csp. 20 gramos • Gel tópico de Cobre sulfato 0'1-0'3% + Zinc sulfato 0'1-0'3%, csp. 20 gramos • Solución tópica de Zinc Sulfato 0'5- 	1-5 aplicaciones/día

	1%, csp. 50 mL	
Herpes genital recurrente	<ul style="list-style-type: none"> • Crema W/S de Lito succinato 8% + Zinc sulfato 0'05%, csp. 100 gramos • Solución tópica de Zinc Sulfato 0'5-1%, csp. 50 mL 	1-2 aplicaciones/día
Hidratante	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Aceite de Caléndula 10% + Ácido Salicílico 0'5% + Exto. C. asiatica 10% + Urea 5%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Aceite de Caléndula 5% + Urea 5-10%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Aceite de Rosa Mosqueta 10% + Urea 5-10%, csp. 100 gramos 	2-3 aplicaciones/día
Hidrocistomas ecrinos múltiples para reducir la secreción de sudor de las glándulas sudoríparas	Crema O/W de Atropina-SO ₄ al 1%, csp. 100 gramos	
Hiperaldosteronismo primario	Suspensión oral de Espironolactona 10 mg/mL, csp. 100 mL	
Hiperhidrosis (plantar, axilar [sólo la crema],...)	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Urotropina al 20%, csp. 100 gramos • Mentol, 1% + Zinc óxido, 20% + Acido Bórico, 20% - Talco, csp. 100 gramos • Acido Bórico 30% + Zinc Estearato 5% + Bismuto Subnitrate 5% + Mentol 1% + Alumbre (Aluminio y Potasio Sulfato) 10% + Calamina 10% + Talco, csp. 100 gramos • Solución tópica de Glutaraldehído (al 25%) 10%, csp. 100 mL • Solución tópica de Aluminio Clorhidrato al 6-25%, csp. 100 mL • Solución tópica de Aluminio Clorhidróxido al 15%, csp. 100 mL 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-2 aplicaciones/día • 2-3 aplicaciones/semana • 3-4 aplicaciones/semana
Hiperqueratosis plantar	Crema O/W de Urea al 25%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Hiperpigmentación de la piel	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Ácido Retinoico (Tretinoína) 0'025%+ Hidroquinona 3%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Ácido Retinoico (Tretinoína) 0'1% + Hidroquinona 10% + Triamcinolona acetónido 0'1%, csp. 100 gramos 	1-2 aplicaciones/día
Hiperqueratosis	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Ácido Salicílico 3% + Amonio Lactato 12% + Urea 10%, csp. 100 gramos • Gel tópico de Ácido Salicílico 10-20%, csp. 100 gramos • Loción O/W de Acido Salicílico 2-4% + Mentol 1% + Urea 10%, csp. 100 gramos 	1-2 aplicaciones/día
Hiperqueratosis palmar,	<ul style="list-style-type: none"> • Gel tópico de Acido Salicílico 2-5% 	1-2 aplicaciones/día

dermatosis secas con grietas	<ul style="list-style-type: none"> + Triamcinolona acetónido 0'1% + Urea 5-15%, csp. 100 gramos • Gel tópico de Ácido Salicílico 1-6% + Urea 10-20%, csp. 100 gramos 	
Hiperuricemia (en pediatría)	Suspensión oral de Alopurinol, 20 mg/mL, csp. 100 mL	
Hipotiroidismo (en pediatría)	<ul style="list-style-type: none"> • Jarabe de L-Tiroxina, 26'67 mcg/mL, csp. 75 mL • Solución oral de L-Tiroxina 150 mcg, csp. 1 mL 	<p>0-6 meses --> 25-50 mcg/día 6-12 meses --> 50-75 mcg/día 1-5 años --> 75-100 mcg/día 6-12 años --> 100-150 mcg/día</p>
HTA (en pediatría)	<ul style="list-style-type: none"> • Jarabe de Propranolol 1 mg/mL, csp. 100 mL • Solución oral de Propranolol, 1 mg/mL, csp. 100 mL • Solución oral de Captoprilo 1-2 mg/mL, csp. 100 mL • Solución oral de Enalaprilo maleato 4 mg/mL, csp. 25 mL • Solución oral de Nifedipino 100 mg, csp. 100 mL • Suspensión oral de Espironolactona 10 mg/mL, csp. 100 mL 	
ICC (en pediatría)	<ul style="list-style-type: none"> • Solución oral de Captoprilo 1-2 mg/mL, csp. 100 mL • Solución oral de Enalaprilo maleato 4 mg/mL, csp. 25 mL • Suspensión oral de Espironolactona 10 mg/mL, csp. 100 mL 	
Ictiosis	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Acido Láctico 1% + Urea 10%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Lanolina 15% + Urea 10%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Vitamina A hidrosoluble 2% + Urea 10%, csp. 100 gramos 	2-3 aplicaciones/día
Infecciones cutáneas por microorganismos sensibles	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Cloranfenicol 1%, csp. 100 gramos • Pomada anhidra de Cloranfenicol 1% + Metronidazol 1%, csp. 100 gramos • Pomada anhidra de Cloranfenicol al 1%, csp. 100 gramos • Pomada de Aceite Caléndula 10% + Clotrimazol 1% + Ext. C. asiatica 10% + Metronidazol 1%, csp. 100 gramos 	2-3 aplicaciones/día
Infecciones cutáneas con componente inflamatorio	Crema O/W de Eritromicina 2% + Hidrocortisona 1%, csp. 100 gramos	2-3 aplicaciones/día
Inmunosupresor (para pediatría)	<ul style="list-style-type: none"> • Jarabe de Azatioprina, 10 mg/mL, csp. 30 mL • Suspensión oral de Tacrólimus 0'5 mg/mL, csp. 100 mL 	<ul style="list-style-type: none"> • Dosis según peso y edad • 0,15 a 0,3 mg/kg/día, dividida cada 12 horas y

		ajustando la dosis según niveles plasmáticos. Tomar en ayunas
Intertrigo	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Clotrimazol 1% + Sodio Fusidato 2-4% + Triamcinolona acetónido 0'1%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Zinc óxido 5-10%, csp. 100 gramos • Pomada anhidra de Brea de Hulla (Coaltar) 5-10% + Zinc óxido 10-30%, csp. 100 gramos 	2-3 aplicaciones/día
Líquen plano oral	<ul style="list-style-type: none"> • Pasta tópica oral de Acido Retinoico 0'03%, csp. 30 gramos • Pasta tópica oral de Acido Retinoico 0'05% + Clobetasol propionato 0'05% + Clotrimazol 1%, csp. 30 gramos • Pasta tópica oral de Clotrimazol 1% + Tacrólimus 0'1%, csp. 30 gramos • Pasta tópica oral de Fluocinolona acetónido 0'1%, csp. 30 gramos 	1 aplicación después de cada comida
Lengua negra vellosa	Gel tópico de Clotrimazol 1% + Urea 40%, csp. 100 gramos	Cepillarse la lengua con el gel y la ayuda de un cepillo de dientes durante 1-2 minutos y después raspar la lengua con una cucharilla
Manos agrietadas	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Ácido Salicílico 2-4% + Aloe vera 10%, csp. 100 gramos • Crema W/O de Ácido Salicílico 1-10% + Triamcinolona acetónido 0'1% + Urea 5-10%, csp. 100 gramos • Pomada de Acido Salicílico 1% + Alantoína 0'5% + Ictiol 1%, csp. 100 gramos 	2-4 aplicaciones/día
Mastopatías (Reabsorción de bultos de grasa en las mamas. Tensión premenstrual)	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Progesterona 1-10%, csp. 100 gramos • Gel tópico de Progesterona 1-10%, csp. 100 gramos 	1 aplicación/12 horas
Micosis oral	<ul style="list-style-type: none"> • Gel bucal de Ketoconazol al 2%, csp. 100 mL • Colutorio de Ketoconazol al 2%, csp. 100 mL 	1-4 aplicaciones/día reteniendo el mayor tiempo posible el gel en la boca. Si hay afectación del esófago, se tragará el gel
Micosis	<ul style="list-style-type: none"> • Gel tópico (neutro) de Ketoconazol 2%, csp. 100 gramos • Loción O/S de Ketoconazol 2%, csp. 100 gramos • Pomada anhidra de Ketoconazol 2%, csp. 100 gramos 	2 aplicaciones/día
Micosis con componente inflamatorio y pruriginosas	• Crema O/W de Clotrimazol 1% + Triamcinolona acetónido 0'1%, csp. 100 gramos	1-3 aplicaciones/día

	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Hidrocortisona 1% + Ketoconazol 2%, csp. 100 gramos 	
Micropene infantil	Gel tópico genital de Testosterona propionato 2%, csp. 100 gramos	
Molluscum contagiosum	Solución tópica de Potasio hidróxido al 5-15%, csp. 50 mL	Pincelar la lesión y esperar 1-2 minutos (o lo máximo que se aguante). Después lavar con agua y aplicar povidona iodada. Dos veces al día
Mucositis	<ul style="list-style-type: none"> • Colutorio de Gentamicina·SO₄ 80 mg + Hidrocortisona 100 mg + Lidocaína·HCl 2%+ Nistatina 100.000 UI/mL, csp. 100 mL • Colutorio de Clorhexidina digluconato 0'12% + Lidocaína·HCl 1% + Nistatina 100.000 UI/mL, csp. 100 mL 	Mucositis: 2-4 enjuagues/día antes de comidas
Mucositis post-radioterapia	Colutorio (gel bucal) de Aluminio Hidróxido 5%+ Difenhidramina·HCl 0'25%+ Lidocaína·HCl 2%, csp. 100 mL	2-4 enjuagues/día antes de comidas

Muguet, úlceras aftosas, estomatitis, antiséptico bucal	Colutorio de Bórax 2% + Glicerina 10% + Esencia de Menta 10 gotas + Sodio bicarbonato 1%, csp. 100 mL	Gargarismos 2-3 vces al día
Neuralgia	Jarabe de Amitriptilina·HCl, 25 mg/mL, csp. 50 mL	
Neuralgia pot-herpética	Crema O/W de Capsaicina al 0'025 - 0'2%, csp. 100 gramos	4-6 aplicaciones/día
Neuropatía diabética	Crema O/W de Capsaicina al 0'025 - 0'2%, csp. 100 gramos	4-6 aplicaciones/día
Onicogriposis (uñas duras y muy grandes)	Crema O/W de Urea al 40%, csp. 100 g	1 aplicación nocturna en cura oclusiva
Onicopatías (uñas frágiles, quebradizas, despegadas de la piel)	Crema O/W de Vitamina E acetato 5%, csp. 100 gramos	2 aplicaciones/día
Otalgia (no infecciosa)	<ul style="list-style-type: none"> • Gotas óticas de Lidocaína·HCl al 0'5%, csp. 50 mL • Gotas óticas de Triamcinolona acetónido al 0'1%, csp. 50 mL 	2-3 gotas/6 horas
Otitis externa	<ul style="list-style-type: none"> • Gotas óticas de Ácido Bórico a saturación, csp. 50 mL • Gotas óticas de Acido Bórico al 2%, csp. 50 mL • Gotas óticas de Ácido Acético glacial 1%, csp. 50 mL • Gotas óticas de Ciprofloxacino·HCl 2%, csp. 50 mL 	2-5 gotas/8 horas

Otitis externa com componente inflamatorio	Gotas óticas de Ácido Acético medicinal 2% + Hidrocortisona 1%, csp. 50 mL	
Otomycosis	Gotas óticas de Clotrimazol al 1% (ó Ketoconazol 2%), csp. 50 mL	3-5 gotas/12 horas
Otomycosis candidiásica	Gotas óticas de Nistatina 3.000.000 UI, 30 mL	4-5 gotas/12 horas
Otomycosis con compoente inflamatorio	Gotas óticas de Betametasona dipropionato 0'05% + Clotrimazol 1%, csp. 50 mL	3-5 gotas/12 horas
Pediculosis	<ul style="list-style-type: none"> • Loción O/W de Dimeticona al 4%, csp. 100 gramos • Solución tópica de Permetrina al 1'5%, csp. 100 mL 	Aplicar sobre el cabello y dejarlo durante 8-12 h y posteriormente lavar
Pénfigo vulgar	Solución oral oleosa de Ciclosporina al 10%, csp. 50 mL	Enjuagues orales 3 veces al día
Pie de atleta	<ul style="list-style-type: none"> • Gel tópico (neutro) de Miconazol-NO₃ al 2%, csp. 100 gramos • Solución tópica de Aluminio Clorhidrato al 6-25%, csp. 100 gramos 	2 aplicaciones/día
Pre-anestesia (pediatría)	Jarabe de Midazolam, 5 mg/mL, csp. 50 mL	
Prurito	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Ácido Salicílico 2-4% + Mentol 0'5% + Urea 10%, csp. 100 gramos 	1-3 aplicaciones/día
	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Capsaicina al 0'025 - 0'2%, csp. 100 gramos 	4-6 aplicaciones/día
	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Doxepina al 5%, csp. 100 gramos 	2-4 veces al día (dejar pasar al menos 3 horas entre cada aplicación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Mentol 0'5-1%, csp. 100 gramos • Loción O/W de Triamcinolona acetónido 0'1% + Mentol 0'5% + Lanolina 6% + Urea 15%, csp. 100 gramos 	2-4 veces/día
Prurito genital	<ul style="list-style-type: none"> • Polvos de Alcanfor 1g + Mentol 1g + Zinc óxido 25g, csp. 50 gramos 	2-4 veces/día
	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W vaginal de Lidocaína·HCl, 2%, csp. 100 gramos • Gel acuoso de Lidocaína·HCl 1-2%, csp. 100 gramos 	2-4 aplicaciones/día
Psoriasis	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Ácido Retinoico (Tretinoína) 0'1% + Betametasona dipropionato 0'5% + Urea 10%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Ácido Retinoico 	1-2 aplicaciones/día. Empezar con una aplicación al día por la noche y a medida que aumente la tolerancia se pasará a 1

	<p>(Tretinoína) 0'025-0'15% + Triamcinolona acetónido, 0'1%, csp. 100 gramos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Ácido Salicílico 0'4% + Ditranol (Antralina) 0'4%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Halcinónida 0'2% + Urea 10-15%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Tardoak 1%, csp. 100 g • Crema O/W de Triamcinolona acetónido 0'1% + Urea 10% + Lanolina 6%, csp. 100 g • Crema O/W de Triamcinolona 0'1% + Urea 10%, csp. 100 g • Crema W/O de Ácido Retinoico (Tretinoína) 0'1% + Betametasona dipropionato 0'5%, csp. 100 gramos • Crema W/O de Triamcinolona acetónido 0'1% + Urea 10-15%, csp. 100 gramos • Suspensión tópica de Ácido Retinoico 0'1% + Ácido Salicílico 1% + Betametasona dipropionato 0'5%, csp. 100 mL • Loción O/W de Triamcinolona acetónido 0'1% + Lanolina 6% + Urea 10%, csp. 100 gramos • Pomada de Acido Salicílico 5% + Betametasona dipropionato 0'2% + Urea 10%, csp. 100 gramos 	<p>aplicación cada 12 horas 1 aplicación por la noche antes de acostarse</p>
Psoriasis del cuero cabelludo	<ul style="list-style-type: none"> • Solución tópica de Acido Salicílico 2% + Clobetasol propionato 0'05% + Urea 10%, csp. 100 mL • Solución tópica de Ácido Salicílico 5-10% + Clobetasol propionato 0'05%, csp. 100 mL • Solución tópica de ácido Salicílico 3% + Urea 3%, csp. 100 mL 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-3 aplicaciones/día • Se aplica por la noche sobre el cuero cabelludo; a la mañana siguiente se lava con un champu específico para psoriasis
Psoriasis en placas	<p>Crema O/W de Ácido Salicílico 10% + Tracólimus 0'1-0'3%, csp. 100 gramos</p>	<p>1-2 aplicaciones/día</p>
Queilitis, sequedad labial	<p>Pomada labial de Aceite de Rosa Mosqueta 20% + Vitamina E 1%, csp. 20 gramos</p>	<p>A demanda</p>
Quemaduras	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Aceite de Caléndula 10% + Ácido Tánico 5% + Exto. C. asiatica 10%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Aceite de Rosa Mosqueta 10% + Alantoína 0'5% + Exto. C. asiatica 10%+ Ictiol 1% + Zinc óxido 5%, csp. 100 gramos • Pomada anhidra de Brea de Hulla 	<p>1-3 aplicaciones/día</p>

	(Coaltar) 5-10% + Zinc óxido 10-30%, csp. 100 gramos	
Queratosis solar y senil, enfermedad de Bowen, epiteloma maligno superficial (simple o múltiple)	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de 5-Fluorouracilo al 5%, csp. 100 gramos • Pomada anhidra de 5-Fluorouracilo 5%, csp. 100 gramos • Pomada de Fluorouracilo 5%, csp. 100 gramos 	1 aplicación/día durante 3-4 semanas
Quiste hidátidico	Jarabe al 50% de Mebendazol al 3%, csp. 100 mL	Según peso corporal
Repelente de insectos (para empapar las mosquiteras)	Solución tópica de Permetrina al 1'5%, csp. 100 mL	
Rosácea	<ul style="list-style-type: none"> • Crema-gel de Metronidazol 1%, csp. 60 gramos • Crema W/S de Metronidazol 1%, csp. 100 gramos • Gel tópico de Ácido Azelaico al 15%, csp. 100 gramos 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-2 aplicaciones/día • 1 aplicación/12 horas durante 1-2 meses (máximo 6 meses seguidos)
Rosácea asociada a dermatitis seborreica	<ul style="list-style-type: none"> • Gel tópico (neutro) de Ketoconazol 2% + Metronidazol 1%, csp. 100 gramos • Gel tópico de Hidrocortisona 1% + Ketoconazol 2% + Metronidazol 1%, csp. 100 gramos 	2 aplicaciones/día
Rosácea eritematotelangiectásica (flushing)	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Metronidazol 1%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Metronidazol 1% + Tacrólimus 0'03-0'05%, csp. 100 gramos • Solución tópica de Agua de Hamamelis 10% + Agua de Laurel cerezo 10% + Agua de Rosas 10%, csp. 100 mL 	1-2 aplicaciones/día
Rosácea papulopustular	<ul style="list-style-type: none"> • Gel tópico (neutro) de Metronidazol 1%, csp. 100 gramos • Gel tópico de Eritromicina 2% + Hidrocortisona 0'5% + Metronidazol 1%, csp. 100 gramos 	1 aplicación/12 horas
Rosacea seborreica	Crema O/W de Ictiol 1% + Hidrocortisona 1% + Ketoconazol 2% + Metronidazol 1%, csp. 100 gramos	1 aplicación/12 horas
Sabañones	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Escina 1% + Urea 10%, csp. 100 gramos • Gel tópico de Ácido Tánico 5-10% + Alantoína 0'5% + β-Escina 1%, csp. 100 gramos 	2-4 aplicaciones/día

	<ul style="list-style-type: none"> Solución tópica de Acido Tánico 30%, csp. 50 mL 	
Sarna	<ul style="list-style-type: none"> Crema O/W de Permetrina al 5%, csp. 100 gramos Loción O/W de Permetrina 5%, csp. 100 gramos 	1 sola aplicación en todo el cuerpo excepto en la cabeza previa ducha; se aplica por la noche antes de acostarse y se ducha a la mañana siguiente
Sarna costrosa	Cápsulas de Ivermectina, x mcg – Para una cápsula N° 100	200 µg/Kg de peso/día
Sedante (en pediatría)	<ul style="list-style-type: none"> Jarabe de Hidrato de Cloral, 100 mg/mL, csp. 100 mL Jarabe de Midazolam, 5 mg/mL, csp. 50 mL Suspensión oral de Nitrazepam 0'1%, csp. 100 mL 	
Sequedad cutánea	<ul style="list-style-type: none"> Crema O/W de Ácido Salicílico 2-4% + Mentol 0'5% + Urea 10%, csp. 100 gramos Crema O/W de Ácido Salicílico 3% + Amonio Lactato 12% + Urea 10%, csp. 100 gramos Crema de Aceite de Jojoba 1% + Colágeno soluble 5%, csp. 100 gramos Crema de Aceite de Caléndula 2% + Vitamina F 1% + Urea 5%, csp. 100 g 	1-3 aplicaciones/día
Síndrome de 'Darier'	Loción O/W de Acido Retinoico 0'1% + Indometacina 3%, csp. 100 gramos	Aplicar por la noche durante 30 min.; después lavar con agua la zona. Ir aumentando progresivamente el tiempo de aplicación hasta tolerarla toda la noche.
Sinusitis	Solución (vahos) alcohólica de Mentol 4-6%, csp. 100 mL	Hacer vahos 2-3 veces/día con un poco de agua y 15 mL de solución
Teniasis	Cápsulas de Niclosamida 500 mg – Para una cápsula N° x (donde x es 2 ó 3 cápsulas)	Hasta 34 kg --> 1 g/día. Más de 34 kg --> 1,5 g/día. Dosis única
Traumatismos con hematoma (sin herida)	Crema O/W de Aceite de Caléndula 10% + Extó. C. asiática 10% + Heparina-Na 1000 UI/gramo, csp. 100 gramos	1-3 aplicaciones/día
Tricomonas	Suspensión oral de Metronidazol, 10 mg/mL, csp. 100 mL	
Tuberculosis (en pediatría)	<ul style="list-style-type: none"> Jarabe de Rifampicina, 10 mg/mL, csp. 100 mL Solución oral de Isoniazida, 10 mg/mL, csp. 100 mL Suspensión oral de Pirazinamida, 100 mg/mL, csp. 40 mL 	

Tumores: Tratamiento paliativo	<ul style="list-style-type: none"> • Cápsulas de Dexametasona 4 mg – Para una cápsula N° 100 • Solución oral de Dexametasona fosfato 4 mg/mL, csp. 50 mL 	1-16 mg/día
Úlceras cutáneas, escoriaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Aceite de Caléndula 10% + Ácido Salicílico 0'5% + Exto. C. asiatica 10% + Urea 5%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Aceite de Caléndula 10% + Ácido Salicílico 0'5-1% + Alantoína 0'5% + Hidrocortisona 2% + Urea 10%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Aceite de Caléndula 10% + Ácido Tánico 5% + Exto. C. asiatica 10%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Aceite de Caléndula 10% + Ácido Salicílico 1% + Urea 10%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Aceite de Rosa Mosqueta 10% + Alantoína 0'5% + Exto. C. asiatica + Ictiol 1% + Zinc óxido 5%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Zinc óxido 5-10%, csp. 100 gramos • Gel tópico de Ácido Tánico 5-10% + Alantoína 0'5% + β-Escina 1%, csp. 100 gramos • Gel tópico de Nifedipino al 16%, csp. 100 gramos • Pomada anhidra de Brea de Hulla (Coaltar) 5-10% + Zinc óxido 10-30%, csp. 100 gramos • Pomada de Alantoína 0'5% + Ictiol 1%, csp. 100 gramos • Gel tópico de Diltiazem·HCl 2%, csp. 100 gramos 	<ul style="list-style-type: none"> • 2-3 aplicaciones/día • Se aplica sobre la piel circundante a la herida.
Úlceras por decúbito (prevención)	Solución tópica de Acido Tánico 5%, csp. 50 mL	1 aplicación/6-8 horas
Úlceras infectadas	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Clindamicina·HCl 1% + Gentamicina·SO₄ 0'1%, csp. 100 gramos • Crema W/O de Ácido Tánico 10% + Cloranfenicol 1%, csp. 100 gramos • Crema W/O de Ácido Tánico 10% + Metronidazol 1%, csp. 100 gramos • Gel tópico de Acido Tánico 5% + Metronidazol 1%, csp. 100 gramos 	2-3 aplicaciones/día
Vaginitis inespecíficas. Leucorrea con lesión en la pared vaginal	Crema O/W vaginal de Aceite de Caléndula 5% + Exto. C. asiatica 5%, csp. 100 gramos	1-3 aplicaciones/día

Varices	Solución oral de Castaño de Indias 20 g + Hamamelis 20 g, csp. 100 mL	5 mL (1 g)/8 horas después de comidas. No sobrepasar 5 g/día (aproximadamente 25 mL/día)
Verrugas	<ul style="list-style-type: none"> • 5-FU, 5% + Ácido Salicílico, 10% + Colodión elástico, csp. 10 gramos • Acido Láctico, 5 g + Acido Salicílico, 5 g + Resina de Podofilino, 5 g + Colodión elástico, 30 g • Pomada anhidra de Acido Salicílico 40%, csp. 100 gramos • Solución tópica de Acido Tricloroacético 25%, csp. 10 mL • Solución tópica de Glutaraldehído 25%, 50 gramos • Solución tópica de Podofilum peltatum resina al 25%, csp. 20 gramos • Cápsulas de Zinc (sulfato), 220 mg – Para una cápsula N° 100 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 aplic./12 h/10 días. Entre el 4°-10° día aparecerá una intensa reacción inflamatoria. Cuando ocurra, se interrumpirá la aplicación. La curación (destrucción de la lesión). tiene lugar aprox. a los 15 días de interrumpida la aplicación. No queda cicatriz. • 1 aplicación/día/10-15 días • 1 aplicación/12-48 horas • 1 aplicación cada 2-3 días • 1 aplicación/día • 1 aplicación sobre la zona afectada. Dejar durante 4-6 horas y después lavar con agua y jabón. Aplicar 2 veces/semana (máx. 4 semanas) • 10 mg/Kg peso/día (máximo 600 mg)
Vitíligo	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Monobencileterhidroquinona al 10%, csp. 100 gramos • Gel tópico (neutro) de Kelina al 2% + Fenilalanina al 10%, csp. 100 gramos • Gel tópico de Kelina al 2%, csp. 100 gramos • Loción O/W de Kelina 3%, csp. 100 gramos • Solución tópica de Kelina al 3%, csp. 100 mL 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 aplicación/12 horas durante 1 año • Aplicar 30 minutos antes de la sesión de UVA • Aplicar 30 minutos antes de la sesión de UVA • Aplicar 30 minutos antes de la sesión de UVA • Aplicar 30 minutos antes de la sesión de UVA

Xerosis	<ul style="list-style-type: none"> • Crema O/W de Acido Láctico 1% + Urea 10%, csp. 100 gramos • Crema O/W de Lanolina 15% + Urea 10%, csp. 100 gramos 	2-4 aplicaciones/día
---------	--	----------------------

Notas:

- Crema O/W: Crema de rápida absorción que se elimina fácilmente con agua. Adecuada para lesiones húmedas.
- Crema W/O (pomada): Crema grasa que no se elimina con agua. Adecuada para lesiones secas.
- Crema W/S: Crema de base silicónica, desprovista de excipientes grasos. Adecuada para pieles acneicas, con rosacea.
- Ungüento (pomada anhidra): Excipiente totalmente graso y desprovistos de agua. Adecuado para lesiones muy secas.
- Las cantidades máximas por receta financiadas con cargo al SACyL son:
 - :: Preparados tópicos sólidos (cremas, pomadas, gel, pastas,...): 250 g
 - :: Preparados líquidos orales/tópicos: 1.000 mL
 - :: Cápsulas: 100 U
 - :: Gotas óticas: 50 mL
 - :: Colirios: 1 envase
 - :: Comprimidos: 100 U
 - :: Granulados: 250 g
 - :: Jarabes: 250 mL
 - :: Papeles: 50 U
 - :: Polvos compuestos: 250 g
 - :: Pomadas oftálmicas: 1 envase
 - :: Soluciones estériles: 1.000 mL

Bibliografía:

- Monografías Farmacéuticas. COF Alicante. 1998
- Formulación Magistral de Medicamentos. COF de Vizcaya. 2004
- Formulario Farmacéutico, Volumen I. CGCOF. 1995
- La Formulación Magistral en la Dermatología actual. Llambí F, Umbert P. Guidotti Farma (Grupo Menarini). 1998
- Formulario Magistral. COF de Murcia. 1997
- Manual de Fórmulas Magistrales y Normalizadas. Hospital Son Dureta (Serv. Farmacia) de Palma de Mallorca. 1993
- La Formulación Magistral en la Oficina de Farmacia. 3ª Parte Llopis Clavijo Mª J, Baixauli Comes V. Ed. Distribuciones Cid. 1990
- La Formulación Magistral en la Oficina de Farmacia. 2ª Parte Llopis Clavijo Mª J, Baixauli Comes V
- La Formulación Magistral en la Oficina de Farmacia. 1ª Parte Llopis Clavijo Mª J, Baixauli Comes V

- Formulario Nacional. 1ª edición. Ministerio de Sanidad y Consumo. 2003
- Farmaciagalenica.com, <http://www.farmaciagalenica.com/> . Visitada el 10/04/2007
- CompoundingToday.com, <http://compoundingtoday.com/> . Visitada el 15/04/2007
- Guía Básica para la preparación y administración de medicamentos por vía oral y por vía parenteral[®] , <http://sefh.interguias.com/basedatos.privada/> . Visitada el 13/04/2007
- Formulación en Farmacia Pediátrica, <http://www.manuelaatiensa.info> . Visitada el 12/04/2007
- El Farmacéutico. Revisión hasta diciembre de 2010.
- Offarm. Revisión hasta diciembre de 2010.
- Farmacia Profesional. Revisión hasta diciembre de 2010.
- PAM. Revisión hasta diciembre de 2010.
- Monografías Galénicas. Lab. Glaxo. 1993

*Farmacia Pedro del Río Pérez
Quintana de Rueda (León)*